

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584

„ Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre
nevelési programja”

BICIKLITÚRA

„ Soproni-hegyvidék, Brennberg-Fehérúti tó, Fertő-tó”





TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584

„Soproni-hegyvidék, Brennberg-Fehérúti tó, Fertő-tó”

A Soproni-hegység az Alpokalja osztrák-magyar határon átívelő, a Keleti-Alpok Rozália-hegység nevű része és a Kisalföld közötti átmeneti jellegű hegyvonulat. A Soproni-hegység magyarországi részének két fő völgye a Fűzes-árok a Kecské-patakkal, valamint a Brennbergi-völgy a Rák-patakkal. Jelentősebb vízfolyás még a Liget-patak. Kisebb, mesterséges tavak: Hermesi-tó, Fehérúti tó, Szalamandra-tó. Az állandó források száma 25. A természetes állapotú erdők közül kiemelkednek a terület bükkösei, valamint gyertyános-kocsánytalan tölgyes állományai. Ez utóbbiak gyepszintjében nyílik az erdei ciklámen. A gesztenyés-tölgyesek cserjéje a fekete áfonya. Igazi különlegességnek azok az elemek számítanak, amelyek a Keleti-Alpokból ereszkednek le ideig. Ilyen például a farkasboroszlán és fürtös bodza. Magyarországon csak itt él a havasi palástfű és az enyves aszat.






TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584

„Soproni-hegyvidék, Brennberg-Fehérúti tó, Fertő-tó”

A Soproni-hegység valójában dombság, legmagasabb csúcsai is csak
500 m körüliek:

- ❖ Asztalfő (550 m)
- ❖ Magasbérc (558 m)
- ❖ Rideg-bérc (469 m)
- ❖ Havas-bérc (463)
- ❖ Köveshát (468 m)
- ❖ Ultra(456 m)
- ❖ Muck (523 m)





TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584

„Soproni-hegyvidék, Brennberg-Fehérúti tó, Fertő-tó”

A Hegység földtani felépítése is elég változatosan alakult ki. Jellemző kőzetei a földtörténet ókorában keletkezett, erősen, illetve közepes mértékben átalakult kőzetei:

- ortogneisz
- fillitszerű csillámpala
- fehér kvarcit
- leukofillit

Ezek szép feltárásai a nádormagaslati, deák-kúti és a bánfalvi kőfejtőkben tekinthetők meg.

A Brennbergi-medence alpi eredetű hordalékkal feltöltött süllyedék: az itteni, jó minőségű barnaszénét 1750-tól-1953-ig bányászták.





TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584

„Soproni-hegyvidék, Brennberg-Fehérúti tó, Fertő-tó”

A Fehérúti tóhoz a legkönnyebben a következő útvonalon juthatunk el: Sopronból a városi körforgalmat elhagyva, a Csengery, az Ady és a Brennbergi úton lehet eljutni, a várost elhagyva az erdei iskola, ifjúsági tábor mellett elhaladva, a Görbehalom útjelző tábla után jobbra, a Fehér útra kell kanyarodni. A tó vízminősége kiváló, ezt mutatják a vízben élő rákok is. A tóban többféle hal megtalálható többek között: ponty, amur, csuka, süllő, keszeg, kárász, valamint pisztráng is.





TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584

„Soproni-hegyvidék, Brennberg-Fehérúti tó, Fertő-tó”

A **Fertő tó** vagy röviden – főleg a helybeliek által használt alakjában – Fertő (németül *Neusiedler See*) Magyarország északnyugati határa mentén, Sopron közelében található tó. A Fertő tó Európa legnyugatabbra fekvő sztyepptava és szikterülete. Területén Ausztria és Magyarország osztozik úgy, hogy nagyobbik része osztrák terület. Partvidéke a magyarországi Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz és az ausztriai Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Parkhoz tartozik. A Fertő-táj és ennek részeként Fertő tó a világörökség része. A Fertő tó Közép-Európa harmadik legnagyobb állóvíze, mintegy 20 ezer éves. A Balaton után Közép-Európa második legkönnyebben felmelegedő tava. Hőmérséklete nyaranta nem ritkán eléri a 30°C-ot. A tó nevét adó „fertő” szó már feledésbe merült jelentése mocsaras, agyagos, sáros hely volt. Ez részben ma is igaz, mert a magyar rész vízfelületének 4/5-ét, az osztrákénak felét nád fedi.






TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584

„Soproni-hegyvidék, Brennberg-Fehérúti tó, Fertő-tó”

A Fertő eredete és múltja sokat vitatott kérdés. Régészeti feltárások következtében tudjuk, hogy a tó környéke már az újkőkor óta lakott. A rómaiak *Pelso*, *Pejso* illetve, *Peiso* név alatt ismerték. A *Pelso* eredetileg a Balaton neve. A német *Neusiedl* (régbben Neusiedel) elnevezés a tatárjárás után betelepített német "vendégekre" (*hospites*) utal. A 4. században állítólag Galerius császár kiszárította, de csakhamar újra megtelt vízzel. A 14. században kisebb lehetett a jelenleginél. A közepe táján volt a legkeskenyebb, ahol vámot szedtek. Az a fertői monda, hogy több község előntése által Giletus frankói herceg korában jött volna létre, teljesen alaptalan. A tó gyakori áradása és apadása több oklevélben is nyomon követhető. A tónak a 19. században történő kiszáradása volt a legnevezetesebb. 1855-ben vették észre, hogy a tó vize a rendes partjairól visszahúzódik. Eleinte igen lassan, majd szemmel láthatóan beljebb húzódott, míg 1866 júliusában teljesen eltűnt. A fennmaradt iszap annyira telítődött vízzel, hogy veszélyes volt járni benne. A meder 1869-ig teljesen száraz volt, ezért felszántották és gazdasági épületek épültek benne. A kiszáradás oka a nagy szárazság volt, a tavat tápláló patakok vize is elapadt. A kiszáradás után belsejében sók keletkeztek, a szikpor különösen a keleti parton virágzott ki, ezt a lakók összesöpörték és szappant készítettek belőle. A kiszáradás alatt gyakran délibáb jelent meg. A tó hamar békeszerződéssel vált határ menti tóvá.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.